

BISULTEC

ANTIMICROBIANO PARA AVES Y CERDOS: COMBINACIÓN DE SULFONAMIDAS POTENCIALIZADAS EN SOLUCIÓN ORAL

REGISTRO NO. Q-7050-002



Descripción del Producto

BISULTEC, es una combinación de sulfas. El Sulfametoxazol (absorción y eliminación rápida), con Sulfacloropiridazina (absorción rápida y eliminación lenta) potencializadas con Trimetoprim en proporción de 10:2, respectivamente que actúa contra las principales afecciones respiratorias y digestivas de aves y cerdos, permitiéndoles alcanzar sus parámetros productivos.

Fórmula

Cada litro contiene:

TRIMETOPRIM	4- AMINO -N- (5METIL-3-ISOXAZOLIL) SULFANILAMIDA	4-AMINO-N-(6CLORO-3-PIRIDAZINIL) SULFANILAMIDA	VEHÍCULO C.B.P.
40 g.	160 g.	40 g.	1000 mL

Características

BISULTEC posee un amplio poder bactericida ya que produce un bloqueo a dos enzimas que intervienen directamente en la síntesis catalítica del ácido fólico que es esencial para la reproducción de las bacterias.

Esta doble acción, impide que las bacterias puedan sintetizar ácidos nucleicos y proteínas esenciales para su sobrevivencia y multiplicación

Esta combinación de sulfas potencializadas con Trimetoprim, hace que la concentración mínima inhibitoria de sus componentes sea menor que la que tienen en forma individual.

Los componentes del BISULTEC son bacteriostáticos por separado, en combinación son bactericidas. BISULTEC se distribuye por todos los tejidos del organismo, logrando concentraciones mayores que las observadas en la sangre. Por sus propiedades físico-químicas se concentra sobre todo en el pulmón, en el riñón y en el hígado.

Indicaciones



BISULTEC, por ser de amplio espectro y eficaz acción, es recomendado para el tratamiento de diversas enfermedades causadas por: *Pasteurella* sp, *Salmonella* sp, *Haemophilus* sp, *Escherichia coli*, *Streptococcus* sp y *Staphylococcus* sp.

Dosificación

De 0.5 a 1.0 ml por litro de agua de bebida en un lapso de 4 a 7 días.

Tiempo de retiro

- No enviar animales al rastro sino después de 3 días de haber suspendido el tratamiento.
- Suspender el tratamiento 5 días antes en el caso de aves productoras de huevo para consumo humano

Advertencias

- En climas con temperaturas ambientales altas, donde el consumo de agua de los animales aumenta, la dosis deberá de ser de 0.5 ml. por litro de agua. Diluya el producto en el volumen total de agua a medicarse.
- No se intente hacer soluciones "MADRES" muy concentradas.
- No se deje alcance de los niños
- Manténgase en un lugar fresco y seco
- Consulte al Médico Veterinario.

Presentación

Envase de:

1 L

4 L

20 L